

- **1A, 2A, 3A, etc.:** Ave en su primer año calendario, en su segundo año calendario, en su tercer año calendario, etc.
- **2A+, 3A+, etc.:** Ave en su segundo año calendario o más, en su tercer año calendario o más, etc.
- **Año calendario:** Periodo temporal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
- **Adulta (pluma):** La que procede de un proceso de muda.
- **Ave adulta:** Ave en plumaje adulto.
- **Ave juvenil:** Ave que ostenta el plumaje desarrollado en el nido.
- **Carga alar:** Relación entre la masa del animal y el área total de las alas. Se mide en g/cm<sup>2</sup>.
- **Centro de muda:** Pluma desde la que la muda comienza, en sentido ascendente o descendente.
- **Coberteras mayores (CMa):** Las supracoberteras alares más grandes de las secundarias.
- **Coberteras primarias (CPP):** Las supracoberteras alares más grandes de las primarias.
- **Código EURING:** Código habitualmente usado por los anilladores europeos para la asignación de categorías de edad en las aves (véase anexo 2).
- **Fases:** Variantes de color en el plumaje de una especie, independientes del sexo o la edad.
- **Hemibandera:** Porción del estandarte de la pluma situado a un lado del raquis.
- **Hemibandera externa:** La más distal con respecto al cuerpo del ave, y generalmente más estrecha.
- **Hemibandera interna:** La más proximal con respecto al cuerpo del ave, y generalmente más ancha.
- **Índice de dimorfismo sexual de Storer:** Índice que permite comparar las variaciones dimórficas entre especies. Un índice mayor refleja mayores diferencias entre hembras y machos. Cuando el índice es negativo el tamaño del macho es mayor que el de la hembra. Se calcula mediante la ecuación  $100 * (\text{tamaño medio hembra} - \text{tamaño medio macho}) / 0,5 (\text{tamaño medio hembra} + \text{tamaño medio macho})$ .
- **Juvenil (pluma):** La que no procede de una muda sino que se ha desarrollado en el nido.

- **Muda ascendente:** La que progresa hacia el cuerpo del ave.
- **Muda centrípeta:** Muda de las rectrices cuando empieza por los extremos y progresa hacia las plumas centrales.
- **Muda descendente:** La que progresa hacia la punta del ala.
- **Otoño (1A otoño, 2A otoño, etc.):** Periodo temporal comprendido entre la muda de verano y el 31 de diciembre del año en que se lleva a cabo dicha muda.
- **Primarias (PP):** Rémiges insertas en el metacarpo del ala. En las Estrigiformes son diez y se suelen numerar en sentido descendente.
- **Primavera (1A primavera, 2A primavera, etc.):** Periodo temporal comprendido entre el 1 de enero y la muda de verano de dicho año.
- **Rectrices (RR):** Plumas de la cola. En las Estrigiformes son doce y se numeran por pares desde las centrales hacia las más externas.
- **Relación de aspecto:** Medida de la forma del ala resultante de dividir la longitud de la misma por su anchura media.
- **Rémiges:** Conjunto de plumas primarias y secundarias.
- **Secundarias (SS):** Plumas sujetas al cúbito del ala. Se suelen numerar de fuera hacia adentro.